


Ο σακχαρώδης διαβήτης παγκοσμίως έχει προσβάλλει 246 εκατομμύρια άτομα




Σακχ. Διαβήτης: Ποσοτά επιπολασμού ανά χώρα



Ο σακχαρώδης διαβήτης τύπου 2 είναι μία σταθερά εξελισσόμενη νόσος


UKPDS

■ Συμβατική θεραπεία (n = 1138)
■ Εντατικοποιημένη θεραπεία (n = 2729)




Καθιερωμένη πρακτική προσέγγισης στην αντιμετώπιση του σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2

Αλλαγές στον τρόπο ζωής




UKPDS 35: Σημαντική μείωση κινδύνου εμφάνισης επιπλοκών, σε διαβητικά τύπου 2 άτομα, για κάθε 1% μείωση της HbA_{1c}

N=3642




Διφασική έκπτωση της λειτουργικότητας των β-κυττάρων




- ▲ Αποτυχία Δίαιτας σε έτη 8-10 έτη ◆ Αποτυχία δίαιτας σε 2-4 έτη Αποτυχία Δίαιτας:
 ● Καμία αποτυχία Δίαιτας σε 10 έτη ■ Αποτυχία δίαιτας σε 5-7 έτη Δε χρειάστηκε περαιτέρω διαιτητική παρέμβαση.

Η % επιφάνεια που καταλαμβάνουν τα β-κύτταρα στο πάγκρεας νορμογλυκαιμικών & μη ατόμων



% Ποσοστό συνταγογραφίας Αναλόγων Ινσουλίνης το 2006



ADA/EASD: Αλγόριθμος θεραπευτικής αντιμετώπισης διαβητικών τύπου 2

